











TAPETE VACUNAL

Calendario Vacunación Infantil (nacidos antes del 1 de 2016)


	0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses	18 meses
 <p>IM</p>								
 <p>IM</p>								
 <p>IM</p>								
 <p>IM</p>								
 <p>SC</p>								
 <p>SC</p>								

TAPETE VACUNAL

Calendario Vacunación Infantil (2017)

0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses	18 meses
							
							
							
							
							


Hexyon
 Vaccin diphtérique, tétanique, multicomposé, de l'histoire B (ADN conjugué de l'Haemophilus influenzae)
 suspension injectable en seringue préremplie
 Vale intramusculaire DTCaP-HepB-Hib
 1 seringue préremplie (0,5 ml) avec 3 aiguilles
IM


Prevenar 13
 suspensão injectable / suspensão injetável
 Vacuna antineumocócica polisacárida conjugada (13-valente)
 Vacina pneumocócica polissacárida conjugada (13-valente)
 1 dosis única (0,5 ml) en jeringa precargada con aguja aparte.
 1 seringa pré-cheia para dose única (0,5 ml) com agulha individual.
 Via intramuscular.
 Agitar bien antes de utilizar.
IM


NeisVac-C
 Injektions suspension in einer Fertigspritze
 Adsorbierter Meningokokken Serogruppe C- Polysaccharid-Konjugatimpfstoff
 1 Spritze zu 0,5 ml
 Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Baxter AG, A-1221 Wien
IM


MARVaxPro
 Вакцина против кори, паротита и эпидемического паротита
 Vaccine against measles, mumps and rubella (varicella)
 Vacina contra a caxumba, parotite e rubéola (catapora)
 1 seringa única (0,5 ml) con aguja aparte.
 1 seringa pré-cheia (0,5 ml) com agulha individual.
SC


VARIVAX polvo y disolvente para suspensión inyectable
 Vacuna antivariçela (virus vivos)
 polvo y disolvente para suspensión inyectable en seringa precargada.
 polvo de 1,0 ml de dosis única (0,5 ml) + 1 seringa precargada (disolvente) 2 agujas separadas.
 Via intramuscular (IM) o subcutánea (SC).
 Agitar el producto antes de utilizar este medicamento.
SC