



Servicio Andaluz de Salud

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Hospital Universitario Reina Sofía

RECURSOS MATERIALES

para *el* CUIDADO *de*

HERIDAS

crónicas y *agudas*

CONTENIDO:

Productos	4
Objetivos y Criterios de indicación	5
Ámbito asistencial	6
Método	8
Leyenda	9

Autores:

- Lorenzo Pérez Santos. Enfermero consultor de heridas crónicas y agudas . Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
- M^a Ángeles Turrado Muñoz. Coordinadora de la UGC de Medicina Interna. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
- Juan Antonio Moral Arroyo. Enfermero de la UGC de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Edita:

- Unidad Integrada de Formación. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Actualizado en Mayo de 2019 v.3

Basado en el mejor conocimiento científico disponible y con el mejor juicio clínico posible.

Este documento es una ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria.

No es de obligado cumplimiento ni sustituye el juicio clínico del profesional sanitario.

PRODUCTOS:

Ácidos grasos hiperoxigenados	10
Soluciones limpiadoras	12
Apósitos hidrocoloides	18
Apósitos hidrocélulares	22
Apósitos de hidrofibra de hidrocoloide	34
Apósitos de alginato cálcico	36
Apósitos combinados	38
Apósitos de plata (antimicrobianos)	40
Tul no adherente	48
Terapia de Presión Negativa (TPN)	52
Hidrogel	56
Apósitos de fibras poliacrilato	58
Productos barrera	62
Película de poliuretano transparente	64
Colagenasa	66
Sulfadiazina argéntica	68
Mupirocina ISDIN	70
Metronidazol tópico	72
Corticoides tópicos	74
Antifúngicos tópicos	78
Cremas o emulsiones hidratantes	80
Otros recursos adicionales	82

OBJETIVOS

- Conocer los recursos materiales existentes para el cuidado de heridas en el Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba).
 - Utilizar los apósitos de cura húmeda en función de unos criterios sencillos de aplicación para el abordaje inicial de cualquier herida crónica y/o aguda.
 - Dar importancia a las pomadas o cremas como alternativa terapéutica.
-

CRITERIOS DE INDICACIÓN

- Necesidad de desbridamiento
 - Nivel de exudado
 - Riesgo de infección y signos de infección
 - Adaptabilidad al lecho de la herida
-

ÁMBITO ASISTENCIAL

Cualquier paciente adulto o niño con heridas crónicas y agudas.

Pacientes con:

- **Úlceras Por Presión (UPP)**, inclusive niños.
- **Úlceras de la extremidad inferior (UEI)**, de origen venoso, arterial o neuropático.
- **Úlceras Neoplásicas (UN)**.
- **Dermatitis asociada a la incontinencia (DAI)**: describe el daño sin o con pérdida cutánea debido a la exposición a la orina o las heces, inclusive en niños.
- **Dehiscencia Sitio Quirúrgico (SQD)**, inclusive en niños.
- **Quemaduras (Q)**, inclusive epitelitis por radioterapia y en niños.
- **Pérdida Cutánea (PC)** sin o con exposición ósea/tendinosa: de origen quirúrgico (sinus pilonidal, zona donante de injerto cutáneo y defectos cutáneos por complicaciones de la cirugía), traumático (hematoma), infecciosos (celulitis, fascitis necrosante), sistémico (edema). Inclusive en niños.

- **Otras (O)**, inclusive en niños: Enfermedades ampollas (epidermiolisis bullosa y pénfigo). Síndrome Estafilocócico de Piel Escaldada (SEPE). Impétigo ampolloso. Enfermedades inflamatorias: pioderma gangrenoso, Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), Necrolisis Epidérmica Tóxica (NET). Enfermedades autoinmunitarias (vasculitis) y reumáticas (esclerodermia). Calcifilaxis. Enfermedades por infecciones generalizadas, tanto bacterianas como víricas (sepsis generalizadas).



MÉTODO

Se han considerado en las recomendaciones de los productos los beneficios en salud, efectos adversos, compatibilidades y qué heridas son las recomendadas en cada caso.

Los apósitos actuales han sido aprobados en el expediente de compra 676/2017 (PA26/17) de la provincia de Córdoba.

Las pomadas o cremas son productos habituales en la Unidad Farmacia de nuestro hospital.

La elección final del producto, ya sea apósito, pomada o crema, será en función de estos criterios de indicación:

- **Necesidad de desbridamiento**
- **Nivel de exudado**
 - ⇒ Nulo
 - ⇒ Escaso: restos en la gasa.
 - ⇒ Moderado: gran cantidad en la gasa.
 - ⇒ Abundante: deterioro de la piel perilesional.
- **Riesgo de infección**

Heridas que debido a su localización, profundidad o extensión pueden presentar una elevada carga bacteriana.
- **Signos de infección**

Inflamación, tumefacción, enrojecimiento, aumento nivel de exudado, cambio en la coloración del exudado (color verdoso), exudado purulento, decoloración y fragilidad del tejido de granulación, sangrado fácil o fiebre.
- **Adaptabilidad al lecho de la herida**

Capacidad del apósito de cubrir íntegramente el lecho de la herida.

LEYENDA



ÚLCERAS POR PRESIÓN



ÚLCERAS EXTREMIDAD INFERIOR



ÚLCERAS NEOPLÁSICAS



DERMATITIS ASOCIADA A LA INCONTINENCIA




DEHISCENCIA SITIO QUIRÚRGICO



QUEMADURAS



PÉRDIDAS CUTÁNEAS



OTROS

ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS

Recomendaciones

- Producto para la prevención de úlceras por presión . Posibilita una óptima hidratación y tonicidad de la piel.
- Aplicar suavemente en piel sometida a presión. Hay sugerencias de efectividad para tratamiento de lesiones en estadio I.



GENÉRICO DE CENTRO	
	D47629
	D54121
NOMBRE COMERCIAL	
	Corpitol 20 ml
	Corpitol 50 ml



SOLUCIONES LIMPIADORAS

Suero salino isotónico 0,9%

Recomendaciones

- Facilita la retirada de los restos de piel, tejido desvitalizado, exudados o residuos de apósitos. Su uso mediante irrigación se correlaciona con una reducción del recuento bacteriano en la herida, además de favorecer el proceso de curación.
- Pacientes con: todo tipo de heridas crónicas y agudas.



GENÉRICO DE CENTRO

D61236

D61235

B38010

NOMBRE COMERCIAL

Suero salino isotónico 0,9% 100ml

Suero salino isotónico 0,9% 250ml

Suero salino isotónico 0,9% 500ml



SOLUCIONES LIMPIADORAS

Clorhexidina Acuosa

Recomendaciones

- Limpieza, descontaminación o eliminación de tejido desvitalizado y exudados existente en heridas con riesgo o signo de infección. Citotóxica para el tejido de granulación. Rápida efectividad bactericida con efecto residual de 6 horas, no inactivándose en presencia de materia orgánica. Posibilidad de efectos secundarios (prurito o escozor), necesitando un lavado posterior para eliminar los restos del antiséptico. No se recomienda su uso de manera rutinaria.
- Pacientes con: todo tipo de heridas crónicas y agudas.



GENÉRICO DE CENTRO

E76118

D92381

NOMBRE COMERCIAL

Cristalmina 2% 125 ml

Aquaseptic 2% 250 ml



SOLUCIONES LIMPIADORAS

Polihexanida 0,1%

Recomendaciones

- Limpieza, descontaminación o eliminación de tejido desvitalizado y exudados existente en heridas con riesgo o signo de infección. No citotóxica para el tejido de granulación. Rápida y elevada actividad bactericida, siendo muy activa frente a patógenos multiresistentes. No se recomienda su uso de manera rutinaria.
- Pacientes con: todo tipo de heridas crónicas y agudas.



GENÉRICO DE CENTRO

B41691

NOMBRE COMERCIAL

Prontosan 350 ml



APÓSITOS HIDROCOLOIDES

Recomendaciones

- Nivel de exudado mínimo o moderado sin riesgo o signos de infección. Prevención en zonas no sometidas a presión. Lesiones superficiales en zonas no sometidas a presión. Posibilidad de fugas de exudado que pueden puede afectar al tejido perilesional. Mayor adherencia por consiguiente mayor dolor a la retirada. Mayor incidencia de dermatitis perilesional (enrojecimiento y picor). Opción extrafino para nivel de exudado nulo o escaso y estadios finales de epitelización . Opción pasta para nivel de exudado escaso o nulo sin riesgo o signos de infección en heridas asociada a cavidades.

- Compatible con: apósito de hidrofibra, alginato cálcico, hidrogel y colagenasa. Pacientes con: UPP, UEI, Q 2 grado superficial no extensas, inclusive por radioterapia (epitelitis grado II), SQD, PC sin exposición ósea (especialmente en zonas donantes de injertos cutáneos) y O (no recomendado en enfermedades ampollosas, SSJ, NET y sepsis generalizada).



APÓSITOS HIDROCOLOIDES

GENÉRICO DE CENTRO

E65251

NOMBRE COMERCIAL

Comfeel Plus 15 x 15 cm (apósito extrafino)



GENÉRICO DE CENTRO

E65253

NOMBRE COMERCIAL

Comfeel Plus Extra 20 x 20 cm



GENÉRICO DE CENTRO

E70130

NOMBRE COMERCIAL

Varihesive Gel Control 20 x 20 cm



GENÉRICO DE CENTRO

E64454

NOMBRE COMERCIAL

Varihesive pasta 30 grs



APÓSITOS HIDROCELULARES

(espuma de poliuretano o hidropoliméricos)

Recomendaciones

- Nivel de exudado mínimo, moderado o abundante sin riesgo o signos de infección. Lesiones superficiales o profundas en este caso asociado a otros productos que rellenen la cavidad. Prevención sobre prominencias óseas o zonas sometidas a presión y/o fricción. Opción apósito preformado para sacro, codo y talón.
- Compatible con: apósito de hidrofibra sin o con plata, carbón-plata, alginato cálcico o fibra de poliacrilato y pomada (colagenasa, metronidazol tópico, corticoide tópico sólo o asociado a pomada antibiótica). Paciente con: UPP, UEI, UN, DAI, Q 2 grado superficial no extensas, inclusive por radioterapia (epitelitis grado II y III), SQD, PC con o sin exposición ósea o tendinosa y O (valorar reborde adhesivo en enfermedades ampollosas SSJ y NET. No recomendado en sepsis generalizadas). Especialmente en niños (reducción número de curas).



Apósito hidrocelular sin silicona en su superficie

Sin borde adhesivo

GENÉRICO DE CENTRO

E64945

NOMBRE COMERCIAL

Biatain 15 x 15 cm



GENÉRICO DE CENTRO

E64946

NOMBRE COMERCIAL

Askina Foam
10 x 10 cm



GENÉRICO DE CENTRO

E67980

NOMBRE COMERCIAL

Allevyn Heel
(codo-talón)



Apósito hidrocélular sin silicona en su superficie Con borde adhesivo

GENÉRICO DE CENTRO

E65566

E65018

NOMBRE COMERCIAL

Biatain adhesivo
12,5 x 12,5 cm

Biatain adhesivo
10 x 10 cm



GENÉRICO DE CENTRO

E65582

NOMBRE COMERCIAL

Biatain sacro
17 x 17 cm



GENÉRICO DE CENTRO

E64947

NOMBRE COMERCIAL

Allevyn adhesive
12,5 x 12,5 cm



GENÉRICO DE CENTRO

E64943

E67775

NOMBRE COMERCIAL

Allevyn sacro
17 x 17 cm

Allevyn sacro
22 x 22 cm



Apósito hidrocélular con silicona en su superficie

Sin borde adhesivo

Mepilex XT

Recomendaciones

- Nivel de exudado mínimo, moderado o abundante sin riesgo o signos de infección. Lesiones superficiales o profundas en este caso asociado a otros productos que rellenen la cavidad. Prevención sobre prominencias óseas o zonas sometidas a presión y/o fricción. Incorpora silicona en su superficie proporcionando una adherencia suave que mejora la adaptabilidad a la zona, disminuye el dolor y protege la piel perilesional y piel ya epitelizada.



- Compatible con: apósito de hidrofibra sin o con plata, carbón-plata, alginato cálcico o fibra de poliacrilato y pomada (colagenasa, metronidazol tópico, corticoide tópico sólo o asociado a pomada antibiótica). Paciente con: UPP, UEI, UN, DAI, Q 2 grado superficial no extensas, inclusive por radioterapia (epitelitis grado II y III), SQD, PC con o sin exposición ósea o tendinosa y O (recomendado en enfermedades ampollosas, SSJ, NET y no en sepsis generalizada). Especialmente en niños (reducción número de curas).

GENÉRICO DE CENTRO

E65063

NOMBRE COMERCIAL

Mepilex XT
10 x 20 cm



Mepilex Transfer

Recomendaciones

- Nivel de exudado mínimo, moderado o abundante sin riesgo o signos de infección. Incorpora silicona en su superficie proporcionando una adherencia suave disminuyendo el dolor y protegiendo la piel perilesional y piel ya epitelizada. Gran adaptabilidad a zonas difíciles. Buenos resultados en úlceras neoplásicas de en diversas localizaciones (mama y cuello), quemaduras 2 grado superficial extensas, inclusive por radioterapia (epitelitis grado II y III) y lesiones ampollosas, además en la prevención y tratamiento de UPP para ventilación mecánica no invasiva.



- Compatible con: apósito de hidrofibra sin o con plata, carbón-plata, alginato cálcico o fibra de poliacrilato y pomada (colagenasa, metronidazol tópico, corticoide tópico sólo o asociado a pomada antibiótica). Paciente con: UN, Q 2 grado superficial no extensas, inclusive por radioterapia (epitelitis grado II y III), SQD, PC con o sin exposición ósea o tendinosa y O (recomendado en enfermedades ampollosas, SSJ, NET y no en sepsis generalizada). Especialmente en neonatos y lactantes (reducción número de curas).

GENÉRICO DE CENTRO

E64376

NOMBRE COMERCIAL

Mepilex Transfer

15 x 20 cm



Kliniderm foam silicone

Recomendaciones

- Nivel de exudado escaso o nulo sin riesgo o signos de infección. Prevención en zonas no sometidas a presión o en estadios finales de epitelización. Incorpora silicona en su superficie proporcionando una adherencia suave que mejora la adaptabilidad a la zona y protege la piel perilesional y piel ya epitelizada. Buenos resultados en la prevención y tratamiento de UPP para ventilación mecánica no invasiva.



- Pacientes con: UPP, UEI, Q 2 grado superficial no extensas, inclusive por radioterapia (epitelitis grado II), SQD, PC sin exposición ósea y /o tendinosa y O (recomendado en enfermedades ampollas, SSJ, NET y no en sepsis generalizada). Reducción número de curas en niños.

GENÉRICO DE CENTRO

E64376

NOMBRE COMERCIAL

Kliniderm foam
silicone lite
10 x 10 cm



Apósito hidrocelular con silicona en su superficie Con borde adhesivo

Recomendaciones

- Nivel de exudado mínimo, moderado o abundante sin riesgo o signos de infección. Lesiones superficiales o profundas en este caso asociado a otros productos que rellenen la cavidad. Prevención sobre prominencias óseas o zonas sometidas a presión y/o fricción. Incorpora silicona en su superficie proporcionando una adherencia suave que mejora la adaptabilidad a la zona, disminuye el dolor y protege la piel perilesional y piel ya epitelizada.
- Compatible con: apósito de hidrofibra sin o con plata, carbón-plata, alginato cálcico o fibra de poliacrilato y pomada (colagenasa, metronidazol tópico, corticoide tópico sólo o asociado a pomada antibiótica). Paciente con: UPP, UEI, UN, DAI, Q 2 grado superficial no extensas, inclusive por radioterapia (epitelitis grado II y III), SQD, PC con o sin exposición ósea o tendinosa y O (valorar reborde adhesivo en enfermedades ampollosas SSJ y NET. No recomendado en sepsis generalizadas). Especialmente en niños (reducción número de curas).

GENÉRICO DE CENTRO

E64313

NOMBRE COMERCIAL

Askina DreSil Border
15 x 15 cm



GENÉRICO DE CENTRO

E64314

NOMBRE COMERCIAL

Allevyn Gentle
Border 10 x 10 cm



APÓSITOS DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE

Recomendaciones

- Nivel de exudado moderado o abundante sin riesgo o signos de infección. Gran capacidad de absorción y adaptabilidad al lecho de la herida.



- Compatible con: apósito hidrocoloide, hidrocélular o combinado y pomada (colagenasa, metronidazol tópico, corticoide tópico sólo o asociado a pomada antibiótica). Pacientes con: UPP, UEI, UN, SQD, PC sin / con exposición ósea o tendinosa (no recomendado en zonas donantes de injertos cutáneos) y O (no recomendado en enfermedades ampollosas, SSJ, NET y sepsis generalizadas). No recomendado en Q de espesor parcial por la adherencia en su aplicación, dificultando la valoración de la profundidad existente, la necesidad de higiene o curas frecuentes y aumentando el dolor en la retirada.

GENÉRICO DE CENTRO

E64651

NOMBRE COMERCIAL

Aquacel 10 x 10 cm



APÓSITOS DE ALGINATO CÁLCICO

Recomendaciones

- Nivel de exudado moderado o abundante sin riesgo o signos de infección. Gran capacidad de absorción, poder hemostático y adaptabilidad al lecho de la herida.



- Compatible con: apósito hidrocoloide, hidrocélular o combinado y pomada (colagenasa, metronidazol tópico, corticoide tópico sólo o asociado a pomada antibiótica). Pacientes con: UPP, UEI, UN, SQD y PC sin / con exposición ósea o tendinosa (no recomendado en zonas donantes de injertos cutáneos) y O (no recomendado en enfermedades ampollosas, SSJ, NET y sepsis generalizadas). No recomendado en Q de espesor parcial por la adherencia en su aplicación, dificultando la valoración de la profundidad existente, la necesidad de higiene o curas frecuentes y aumentando el dolor en la retirada.

GENÉRICO DE CENTRO

E64880

NOMBRE COMERCIAL

Urgosorb 10 x 10 cm



APÓSITOS COMBINADOS

(Hidrofibra de hidrocoloide + espuma de poliuretano)

Recomendaciones

- Nivel de exudado moderado o abundante sin riesgo o signos de infección. Lesiones superficiales o profundas (en este caso, asociado a otros productos que rellenen cavidad). Compatible con: apósito de hidrofibra sin o con plata, carbón-plata, alginato cálcico o fibra de poliacrilato y pomada (colagenasa, metronidazol tópico, corticoide tópico sólo o asociado a pomada antibiótica).



- Pacientes con: UPP, UEI, UN, DAI con pérdida cutánea, Q 2 grado superficial, inclusive por radioterapia (epitelitis grado II y III), SQD, PC con o sin exposición ósea y /o tendinosa y O (opción sin reborde en enfermedades ampollosas, SSJ, NET y no recomendado en sepsis generalizadas). Especialmente en niños (reducción del número de curas).

GENÉRICO DE CENTRO

- E64546
- E65104
- E64544

NOMBRE COMERCIAL

- Aquacel Foam 12,5 x 12,5cm
- Aquacel Foam 17,5 x 17,5cm
- Aquacel Foam 15 x 15 cm



APÓSITOS DE PLATA (antimicrobianos)

Hidrofibra con plata

Recomendaciones

- Nivel de exudado moderado o abundante con riesgo o signos de infección. Actúa a nivel de contaminantes de superficie en el lecho de la herida. Pueden necesitar apósito de retención. Opción mecha en heridas asociadas a cavidades.



- Compatible con: apósito hidrocélular o combinado, no colagenasa u otras pomadas (metronidazol tópico, corticoide tópico sólo o asociado a pomada antibiótica). Pacientes con: UPP, UEI, UN, SQD, PC con o sin exposición ósea y/o tendinosa, O (no recomendado en enfermedades ampollosas, SSJ, NET y sepsis generalizadas). No recomendado en Q de espesor parcial por la adherencia en su aplicación, dificultando la valoración de la profundidad existente, la necesidad de higiene o curas frecuentes y aumentando el dolor en la retirada.

GENÉRICO DE CENTRO

E64662

E64846

NOMBRE COMERCIAL

Aquacel Ag 10 x 10 cm

Aquacel Ag 2 x 45 cm



APÓSITOS DE PLATA (antimicrobianos)

Carbón - plata

Recomendaciones

- Nivel de exudado moderado o abundante con signos de infección y olor percibido. Actúan a nivel de contaminantes de superficie en el lecho de la herida. Los apósitos de carbón activado son eficaces ya que absorben los microorganismos contaminantes, responsables del olor. Su asociación a plata aumenta las propiedades antimicrobianas con cobertura a gérmenes aerobios y anaerobios.



- Necesitan apósitos secundarios de retención Compatible con: apósito hidrocélular, hidrofibra, alginato cálcico, combinado e hidrogel, no colagenasa. Pacientes con: UPP, UEI, UN, SQD, PC y O (heridas con olor percibido por sospecha de gérmenes anaeróbicos).


GENÉRICO DE CENTRO

E65338

NOMBRE COMERCIAL

Actisorb plus 25

10,5 x 10,5 cm



APÓSITOS DE PLATA (antimicrobianos)

Apósito hidrocélular con plata sin silicona en su superficie

Recomendaciones

- Nivel de exudado moderado o abundante con riesgo o signos de infección. Actúa a nivel de gérmenes contaminantes de superficie en el lecho de la herida.
- Compatible con: no colagenasa u otras pomadas (metronidazol tópico, corticoide tópico sólo o asociado a pomada antibiótica). Pacientes con: UPP, UEI, UN, SQD, Q 2 grado superficial y profundo, PC con o sin exposición ósea y/o tendinosa y O (recomendado en enfermedades ampollas, SSJ, NET, no en sépsis generalizadas). Especialmente en niños (reducción número de curas).

GENÉRICO DE CENTRO

E65291

E65193

NOMBRE COMERCIAL

Biatain AG 10 x 10 cm

Biatain AG 15 x 15 cm



APÓSITOS DE PLATA (antimicrobianos)

Apósito hidrocélular con plata con silicona en su superficie

Recomendaciones

- Nivel de exudado moderado o abundante con riesgo o signos de infección. Actúa a nivel de gérmenes contaminantes de superficie en el lecho de la herida. Incorpora silicona en su superficie proporcionando una adherencia suave que mejora la adaptabilidad a la zona, disminuye el dolor y protege la piel perilesional y piel ya epitelizada. Buenos resultados en el manejo de quemaduras de 2 grado superficial y profundo tanto en adultos como niños.



- Compatible con: no colagenasa u otras pomadas (metronidazol tópico, corticoide tópico sólo o asociado a pomada antibiótica). Pacientes con: UPP, UEI, UN, SQD, Q 2 grado superficial y profundo, PC con o sin exposición ósea y/o tendinosa y O (valorar reborde adhesivo en enfermedades ampollosas SSJ y NET. No recomendado en sepsis generalizada). Especialmente en niños (reducción de número de curas).

GENÉRICO DE CENTRO

E71864

NOMBRE COMERCIAL

Mepilex Ag 15 x 15 cm

Sin borde adhesivo



GENÉRICO DE CENTRO

E71905

NOMBRE COMERCIAL

Mepilex Border Ag
15 x 15 cm

Con borde adhesivo



TUL NO ADHERENTE

Recomendaciones

- Mallas en diferentes composiciones (silicona, lípido coloidal o grasa) que evitan o minimizan la adherencia al lecho lesional y/o perilesional, respetando las zonas colindantes ya epitelizadas. Lesiones con buen tejido de granulación y/o epitelización. Gran adaptabilidad a superficies extensas y determinadas zonas (cara, pies, manos, zona axilar o perianal).
- Compatible con: colagenasa, metronidazol tópico, corticoide tópico sólo o asociado a pomada antibiótica. Pacientes con: UPP, UEI, UN, DAI con pérdida cutánea, Q 2 grado superficial, inclusive por radioterapia (epitelitis grado II), SQD, PC sin / con exposición ósea o tendinosa y O.



Tul no adherente de malla con silicona

GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
E64985	Adaptic Touch 5 x 7,5 cm
E64988	Adaptic Touch 12,5 x 15 cm
E65004	Adaptic Touch 20 x 32 cm
E64940	Atrauman Silicone 10 x 20 cm



Tul no adherente de malla grasa

GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
FARMACIA	Linitul apósito 9 x 15 cm
	Linitul apósito 15 x 25 cm



Tul no adherente de malla lípido - coloidal

GENÉRICO DE CENTRO
E64983
NOMBRE COMERCIAL
Hydrotul 10 x 12 cm



GENÉRICO DE CENTRO
F34037
NOMBRE COMERCIAL
UrgoTul 10 x 40 cm



TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

Recomendaciones

- Dispositivo de práctica avanzada que proporciona una presión negativa al lecho de la herida, promoviendo la formación de tejido de granulación, mejorando y acelerando la cicatrización. Aumenta la perfusión sanguínea al lecho de la herida, eliminando infección y/o tejido necrótico. La presión ejercida es modificable tanto en intensidad como en ritmo a excepción de la Terapia PICO.
- Se recomienda Terapia VAC con máquina de instilación (antibiótica, antiséptica o desbridante) en el caso de heridas altamente contaminadas e infectadas o con presencia de abundante tejido necrótico.
- Posibilidad de adherencia traumática al lecho de la herida. Se recomienda productos barrera como medida preventiva previo al sellado. Pacientes con: UPP, UEI, SQD, PC con o sin exposición ósea y/o tendinosa. Contraindicado en UN.



Terapia VAC

GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
D42211	Contenedor 500 ml
C28213	Contenedor 300 ml
F27507	Granufoam grande
F27511	Granufoam mediano
F27510	Granufoam pequeño



Terapia Renasys F

GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
D45737	Contenedor 800 ml
F28895	Contenedor 300 ml
F29370	Apósito pequeño 10 x 8 x 3 cm
F29371	Apósito mediano 20 x 13 x 3 cm
F29375	Apósito grande 25 x 15 x 3 cm
F29377	Kit de apósito abdominal 43 x 30 x 3 cm



Terapia PICO (Dispositivo de bolsillo)

GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
E50561	Apósito 10 x 20 cm Apósito 15 x 15 cm
E96456	Apósito 10 x 30 cm Apósito 15 x 20 cm



HIDROGEL

Recomendaciones

- Desbridamiento autolítico y ayuda del enzimático si se asocia a colagenasa. Favorece la formación de tejido de granulación. Para lesiones poco exudativas profundas o cavitadas.
- Compatible con: apósito hidrocoloide, hidrocélular, carbón-plata o tul no adherente y colagenasa. Pacientes con: UPP, UEI, UN, Q 2 grado (superficial y profundo) y tercer grado, inclusive por radioterapia (epitelitis grado II, III y IV), SQD, PC sin / con exposición ósea o tendinosa y O.



GENÉRICO DE CENTRO

E64932

NOMBRE COMERCIAL

Intrasite gel 15g



APÓSITOS DE FIBRAS POLIACRILATO

Recomendaciones

- Heridas con nivel de exudado escaso o moderado en fase de desbridamiento. Retención y absorción de tejido necrótico, desvitalizado y restos de fibrina. No recomendado en necrosis seca. Gran adaptabilidad y adherencia al lecho de la herida. Opción mecha en heridas asociada a cavidades.
- Compatible con: apósito, hidrocélular, hidrofibra, alginato cálcico o combinado. Pacientes con: UPP, UEI, Q 2º grado profundo no extensas, SQD, PC sin / con exposición ósea o tendinosa y O (preferentemente en vasculitis y calcifilaxis). En UN la finalidad no es la cicatrización si no el control del biofilm bacteriano o minimizar complicaciones.



GENÉRICO DE CENTRO

E64737

E64738

NOMBRE COMERCIAL

Urgoclean 10 x 10 cm

Urgoclean 5 x 40 cm



APÓSITOS DE FIBRAS POLIACRILATO

CON TFC-NOSF

Recomendaciones

- Apósito de fibras de poliacrilato con TFC-NOSF (tecnología lípido coloidal con factor nanooligosacárido). Heridas con nivel de exudado escaso estancadas en la fase inflamatoria (exceso de proteasas) del proceso de cicatrización de la herida, dando lugar un retraso en la formación del tejido de granulación o reparación tisular. Gran adaptabilidad y adherencia. Se recomienda curas cada 2-4 días.
- Compatible con: apósito, hidrocélular, hidrofibra, alginato cálcico o combinado. Pacientes con: UPP, UEI, SQD, PC y O (heridas poco extensas de evolución tórpida. Sopesar por su adherencia riesgo/beneficio en enfermedades ampollas).



GENÉRICO DE CENTRO

E69620

NOMBRE COMERCIAL

UrgoStart Plus 10 x 10 cm



PRODUCTOS BARRERA

Recomendaciones

- Producto protector (crema o aerosol) frente a fluidos corporales, exudados, restos de pomadas o fijaciones adhesivas, previniendo lesiones cutáneas. Mantiene la integridad de la piel y favorece el proceso de reparación o cicatrización. Permite ver la lesión y de fácil retirada.
- Compatible con: cualquier apósito o pomada. Pacientes con: UPP, UEI, UN, DAI, SQD, Q inclusive las producida por radioterapia (epitelitis grado I), PC, O.



GENÉRICO DE CENTRO

E77384

NOMBRE COMERCIAL

Cutimet PROTECT crema
90gr

GENÉRICO DE CENTRO

E46802

NOMBRE COMERCIAL

Sillesse spray protector
cutáneo 50ml

PELÍCULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE

Recomendaciones

- Protección de la piel perilesional o zonas sometidas a humedad constante. Permiten ver la lesión y de fácil retirada.
- Pacientes con todo tipo de heridas crónicas y agudas.

GENÉRICO DE CENTRO

E64750

E64840

NOMBRE COMERCIAL

LeuKomed T 8 x 10 cm

LeuKomed T 10 x 12,5 cm



COLAGENASA

Recomendaciones

- Para desbridamiento enzimático de tejido desvitalizado o placa necrótica presente en la herida. Aumentar el nivel de humedad para potenciar su acción o bien utilizar apósitos secundarios. Posibilidad de maceración en zona perilesional. Su acción puede ser neutralizada con metales pesados (plata) y algunos antisépticos (povidona yodada).
- Compatible con: apósito, hidrocélular, hidrofibra, alginato cálcico, combinado, tul no adherente e hidrogel. Pacientes con: UPP, UEI, Q 2º profundo y pequeñas zonas de tercer grado, SQD, PC sin / con exposición ósea o tendinosa y O (preferentemente en vasculitis y calcifilaxis). En UN la finalidad no es la cicatrización si no el control del biofilm bacteriano o minimizar complicaciones.

GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
FARMACIA	Iruxol Mono pomada 15 grs



SULFADIAZINA ARGÉNTICA

Recomendaciones

- Manejo de lesiones con signos de infección o riesgo en superficies extensas. Amplio espectro antibacteriano, muy activa para pseudomonas aeruginosa (Gram -). Gran poder de penetración en la herida (mayor efectividad en zonas profundas). Gran adaptabilidad a superficies extensas y determinadas zonas (cara, pies, manos, zona axilar o perianal). Cura diaria, aplicar fina capa 1 mm.

- Aspecto “pseudopurulento” no significativo de infección al levantar las gasas o compresas, formación de pseudoescara, posibilidad de maceración de piel perilesional, fotosensibilidad a la luz natural en el caso de cura expositiva (tonalidad gris o negra), además de leucopenia transitoria cuando se utiliza en superficies extensas. Compatible con: tul no adherente. Pacientes con: UPP, UEI, UN, Q 2 grado (superficial y/o profundo) y tercer grado, inclusive por radioterapia (epitelitis grado IV), SQD, PC sin / con exposición ósea o tendinosa y O.

GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
FARMACIA	Silverderma crema 100 grs Flamazine crema 500 grs



MUPIROCINA ISDIN (ácido pseudomónico)

Recomendaciones

- Antibiótico tópico muy activo frente a gérmenes Gram + aerobios (Stafilococo aureus o estreptococo pyogenes), no cobertura a Gram - .Indicado en el tratamiento de infecciones dérmicas superficiales de origen estafilocócico. Pomada con un alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas (95%), su aplicación en heridas exudativas se correcciona con una disminución importante en su actividad bacteriana.
- Se recomienda aplicación de fina capa en superficies no extensas poco profundas. Compatible con: apósito, hidrocélular, hidrofibra, alginato cálcico, combinado o tul no adherente. Pacientes con: O (enfermedades ampollosas e impétigo ampolloso).



GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
FARMACIA	Mupirocina ISDIN pomada 15 grs



METRONIDAZOL TÓPICO

Recomendaciones

- Sospecha de infección por gérmenes anaeróbicos, olor percibido incontrolable. Buenos resultados con metronidazol tópico en fórmula magistral a altas dosis (8%). Buenas evidencias en heridas tumorales muy exudativas, con olor fétido u nauseabundo.
- Posibilidad de maceración en zona perilesional. Compatible con: apósito, hidrocélular, hidrofibra, alginato cálcico, combinado o tul no adherente. Pacientes con: UPP, UEI, UN, SQD, PC, y O (heridas con olor percibido por sospecha de gérmenes anaeróbicos).

GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
FARMACIA	Metronidazol pomada tópica (fórmula magistral 8%)



GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
FARMACIA	Rozex gel 0,75%



CORTICOIDES TÓPICOS

Recomendaciones

- Dermatitis asociada a la incontinencia y en zonas perilesionales, periestomales o ya epitelizadas. Se recomienda corticoides de baja o moderada potencia (hidrocortisona, betametasona). Utilizar lociones y cremas, útiles en zonas húmedas y extensas. Se recomienda su uso junto a un producto barrera como medida preventiva. Si dermatitis persistente, posibilidad de sobreinfección por hongos. Puede presentar efectos secundarios: atrofia dérmica, herpes o infección bacteriana.



- Compatible con: apósito, hidrocélular, hidrofibra, alginato cálcico, combinado o tul no adherente. Pacientes con: UPP, UEI, UN, DAI, SQD, Q de primer grado, preferentemente en cara (no más de 48h postquemadura), PC, O (primer escalón en el tratamiento tópico del pioderma gangrenoso).

GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
FARMACIA	Hidrocisdin crema 30 grs Celestoderm crema 30 grs Synalar crema 30 grs Declobán pomada 30 grs



CORTICOIDES TÓPICOS

Recomendaciones

- Corticoide tópico asociado a pomadas antibiótica (ácido fusídico / betametasona). Recomendado en heridas crónicas y agudas con escaso nivel de exudado estancada en la fase inflamatoria del proceso de cicatrización y en hipertrofia del tejido de granulación. Muy activa en infecciones dérmicas estafilocócicas.
- Compatible con: apósito, hidrocelular, hidrofibra, alginato cálcico, combinado o tul no adherente. Pacientes con: UPP, UEI, SQD, Q, PC sin exposición ósea o tendinosa, O (primer escalón del tratamiento tópico del pioderma gangrenoso). No en UN.



GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
FARMACIA	Fucibet crema 30 grs



ANTIFÚNGICOS TÓPICOS

Recomendaciones

- Indicado en dermatitis asociada a la incontinencia que cursa con: Exantema indicativo de una infección fúngica (candidiasis). Descamación en collarete alrededor de la lesión. Formación de pseudomembrana blanquecina. Puede presentar lesiones satélites a nivel inguinal, abdominal, submamario o axilar.
- Se recomienda derivados azólicos (ketoconazol, clotrimazol) en crema o polvo. Se recomienda añadir un corticoide de baja o moderada potencia en lesiones muy inflamatorias (alivio de dolor y/o picor). Se recomienda su uso junto a un producto barrera como medida preventiva. Pacientes con: DAI sin o con pérdida cutánea.

DAI

GENÉRICO DE CENTRO	NOMBRE COMERCIAL
FARMACIA	Fungarest crema 30 grs Canestén crema 30 grs



CREMAS O EMULSIONES HIDRATANTES

Recomendaciones

- Hidratación activa de la piel, favoreciendo su recuperación y mantenimiento. Evitar o reducir el picor producido por la sequedad de la piel. Se recomienda productos con ingredientes oclusivos, humectantes y emolientes.
- Un buen producto hidratante debería contener los tres tipos de ingredientes. Recomendado para cualquier tipo de heridas crónicas y agudas ya epitelizadas.

GENÉRICO DE CENTRO

A52735

F32167

NOMBRE COMERCIAL

Babaria hidratante 500ml

Baktolan Lotion 350ml



OTROS RECURSOS ADICIONALES

Sistema de control de la incontinencia fecal

Recomendaciones

- Sistema de control de la incontinencia fecal. Dispositivo facilitador en el proceso de curación de heridas en cara posterior de muslo, zona glútea y/o perianal.
- Prevención de UPP en pacientes encamados con deposiciones líquidas o semilíquidas. Se recomienda tacto rectal previo a su colocación (ausencia de fecaloma, hemorroide o tumoración). Valorar riesgo y situación clínica del paciente. Reducción de consumo de material y número de curas.

GENÉRICO DE CENTRO

B50897

NOMBRE COMERCIAL

Flexi-Seal



Hospital Universitario Reina Sofia
www.hospitalreinasofia.org

